

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
Департамента здравоохранения
Тюменской области

«20» июня
2023 г.
Н.В. Логинова



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель
Управления Роспотребнадзора
по Тюменской области

«20» июня
2023 г.
Г.В. Шарухо



РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Категории и возраст граждан, подлежащих профилактическим прививкам	Наименование прививки / отдельные контингенты	Порядок проведения профилактических прививок	Источник финансирования
Новорожденные в первые 24 часа жизни	Первая вакцинация против гепатита В	Проводится всем детям вакцинами гепатита В, не содержащими консерванты	финансируется за счет: - средств федерального бюджета, - средств граждан, - средств медицинских организаций частной формы собственности, - других источников, разрешенных законодательством
Новорожденные на 3-7 день жизни	Вакцинация против туберкулеза	Проводится всем детям, не имеющим медицинских противопоказаний	финансируется за счет: - средств федерального бюджета, - средств граждан, - средств медицинских организаций частной формы собственности, - других источников, разрешенных законодательством
Дети в 1 месяц	Вторая вакцинация против гепатита В	Проводится всем детям, вакцинами гепатита В не содержащими консерванты	финансируется за счет: - средств федерального бюджета, - средств граждан, - средств медицинских организаций частной формы собственности, - других источников, разрешенных

		законодательством
Дети в 2 месяца	Третья вакцинация против гепатита В	Проводится детям, из групп риска (родившимся от матери-носителей HBsAg, больных вирусным гепатитом В или перенесших вирусный гепатит В в третьем триместре беременности, не имеющих результатов обследования на маркеры гепатита В, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества, из семей, в которых есть носитель HBsAg или больной острым вирусным гепатитом В и хроническими вирусными гепатитами), вакцинами гепатита В не содержащими консерванты
	Первая вакцинация против пневмококковой инфекции	Проводится коньюгиованными пневмококковыми вакцинами
	Первая вакцинация против ротавирусной инфекции	Проводится недоношенным, маловесным детям вакцинами, зарегистрированными в России в установленном порядке
Дети в 3 месяца	Первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка	Вакцинация детей проводится всеми вакцинами, разрешенными к применению детям данной возрастной группы, в соответствии с инструкциями по применению препаратов, включая комбинированные вакцины

<p>Первая вакцинация против полиомиелита</p> <p>Проводится вакцинами для профилактики полиомиелита (инактивированными), разрешенными к применению детям данной возрастной группы, в соответствии с инструкциями по применению соответствий с инструкциями по применению препаратов, включая комбинированные</p>	<p>финансируется за счет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средств федерального бюджета, - средств граждан, - средств медицинских организаций частной формы собственности, - других источников, разрешенных законодательством
<p>Вторая вакцинация против гемофильной инфекции</p> <p>Вакцинация детей проводится всеми вакцинами, разрешенными к применению детям данной возрастной группы, в соответствии с инструкциями по применению препаратов, включая комбинированные</p>	<p>финансируется за счет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средств федерального бюджета, - средств граждан, - средств медицинских организаций частной формы собственности, - других источников, разрешенных законодательством
<p>Вторая вакцинация против ротавирусной инфекции</p> <p>Проводится недоношенным, маловесным детям вакцинами, зарегистрированными в России в установленном порядке</p>	<p>финансируется за счет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средств регионального бюджета,

Вторая вакцинация против полиомиелита	Проводится вакцинами для профилактики полиомиелита (инактивированными), разрешенными к применению детям данной возрастной группы, в соответствии с инструкциями по применению препаратов, включая комбинированные	финансируется за счет: - средств федерального бюджета, - средств граждан, - средств медицинских организаций частной формы собственности, - других источников, разрешенных законодательством
Вторая вакцинация против пневмококковой инфекции	Проводится коньюгированными пневмококковыми вакцинами	финансируется за счет: - средств федерального бюджета, - средств граждан, - средств медицинских организаций частной формы собственности, - других источников, разрешенных законодательством
Вторая вакцинация против гемофильной инфекции	Вакцинация детей проводится всеми вакцинами, разрешенными к применению детям данной возрастной группы, в соответствии с инструкциями по применению препаратов, включая комбинированные	финансируется за счет: - средств федерального бюджета, - средств граждан, - средств медицинских организаций частной формы собственности, - других источников, разрешенных законодательством
Третья вакцинация против ротавирусной инфекции	Проводится недоношенным, маловесным детям вакцинами, зарегистрированными в России в установленном порядке	финансируется за счет: - средств регионального бюджета,
	Проводится всем детям вакцинами, зарегистрированными в России в установленном порядке	финансируется за счет: - средств граждан, - средств медицинских организаций частной формы собственности, - других источников, разрешенных законодательством

<p>Дети в 6 месяцев</p>	<p>Третья вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка</p>	<p>Вакцинация детей проводится всеми вакцинами, разрешенными к применению детям данной возрастной группы, в соответствии с инструкциями по применению препаратов, включая комбинированные</p> <ul style="list-style-type: none"> - других источников, разрешенных частной формой собственности, - других источников, разрешенных законодательством 	<p>финансируется за счет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средств федерального бюджета, - средств граждан, - средств медицинских организаций частной формы собственности, - других источников, разрешенных законодательством
<p>Третья вакцинация против гепатита В</p>	<p>Проводится всем детям, за исключением детей из «группы риска» (родившимся от матерей-носителей HBs Ag, больных вирусным гепатитом В или перенесших вирусный гепатит В в третьем триместре беременности, не имеющих результатов обследования на маркеры гепатита В, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества, из семей, в которых есть носитель HBs Ag или больной острым вирусным гепатитом В и хроническими вирусными гепатитами), вакцинами гепатита В не содержащими консерванты</p>	<p>финансируется за счет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средств федерального бюджета, - средств граждан, - средств медицинских организаций частной формы собственности, - других источников, разрешенных законодательством 	<p>финансируется за счет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средств федерального бюджета, - средств граждан, - средств медицинских организаций частной формы собственности, - других источников, разрешенных законодательством
<p>Третья вакцинация против полиомиелита</p>	<p>Проводится вакцинами для профилактики полиомиелита (инактивированными), разрешенными к применению детям данной возрастной группы, в соответствии с инструкциями по применению препаратов, включая комбинированные</p>	<p>финансируется за счет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средств федерального бюджета, - средств граждан, - средств медицинских организаций частной формы собственности, - других источников, разрешенных законодательством 	<p>финансируется за счет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средств федерального бюджета, - средств граждан, - средств медицинских организаций частной формы собственности, - других источников, разрешенных законодательством

<p>Дети в 9 месяцев</p>	<p>Первая вакцинация против менингококковой инфекции⁵</p>	<p>Проводится детям из групп риска:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лицам, проживающим в учреждениях с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); - лицам с иммунодефицитным состоянием (первичные иммунодефициты, дефицит системы компонентов комплемента, пропердина, готовящиеся к пересадке органов, и назначению длительной иммуносупрессивной терапии); - лицам с функциональной и анатомической аспленией; - лицам, перенесшим операцию кохлеарной имплантации; - лицам с ликвореей; - лицам с ВИЧ инфекцией; - лицам, проживающих в общежитиях; 	<p>финансируется за счет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средств регионального бюджета, - средств граждан, - средств медицинских организаций частной формы собственности, - других источников, разрешенных законодательством
<p>Дети в 12 месяцев</p>	<p>Вакцинация против кори, эпидемического паротита и краснухи</p>	<p>Проводится всем детям вакцинами, зарегистрированными в России в установленном порядке</p>	<p>финансируется за счет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средств федерального бюджета, - средств граждан, - средств медицинских организаций частной формы собственности, - других источников, разрешенных законодательством

		Вакцинация против ветряной оспы	Провидится детям из групп риска: - с иммунодефицитными состояниями (первичные иммунонодефициты, дефицит системы компонентов комплемента, пропердина, готовящиеся к пересадке органов, и назначению длительной иммunoупрессивной терапии); - с онкогематологическими заболеваниями и/или длительно получающим иммunoупрессивную терапию; - имеющим ВИЧ инфекцию; - детям-сиротам, находящимся в домах ребенка	финансируется за счет: - средств регионального бюджета, - средств граждан, - средств медицинских организаций частной формы собственности, - других источников, разрешенных законодательством
		Четвертая вакцинация против гепатита В	Проводится всем детям вакцинами, зарегистрированными в России в установленном порядке	финансируется за счет: - средств граждан, - средств медицинских организаций частной формы собственности, - других источников, разрешенных законодательством
			Проводится детям из «группы риска» (родившимся от матерей-носителей HBs Ag, больных вирусным гепатитом В или перенесших вирусный гепатит В в третьем триместре беременности, не имеющих результатов обследования на маркеры гепатита В, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества, из семей, в которых есть носитель HBsAg или больной острым вирусным гепатитом В и хроническими вирусными гепатитами), вакцинами гепатита В	финансируется за счет: - средств федерального бюджета, - средств граждан, - средств медицинских организаций частной формы собственности, - других источников, разрешенных законодательством
	Дети в 15 месяцев	Ревакцинация против пневмококковой инфекции	Проводится конъюгированной пневмококковой вакциной	финансируется за счет: - средств федерального бюджета, - средств граждан, - средств медицинских организаций частной формы собственности, - других источников, разрешенных законодательством

<p>Дети в 18 месяцев</p>	<p>Первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка</p>	<p>Вакцинация детей проводится всеми вакцинами, разрешенными к применению детям данной возрастной группы, в соответствии с инструкциями по применению препаратов, включая комбинированные</p>	<p>финансируется за счет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средств федерального бюджета, - средств граждан, - средств медицинских организаций частной формы собственности, - других источников, разрешенных законодательством
<p>Дети в 20 месяцев</p>	<p>Вторая ревакцинация против гемофильной инфекции</p>	<p>Вакцинация детей проводится всеми вакцинами, разрешенными к применению детям данной возрастной группы, в соответствии с инструкциями по применению препаратов, включая комбинированные</p>	<p>финансируется за счет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средств федерального бюджета, - средств граждан, - средств медицинских организаций частной формы собственности, - других источников, разрешенных законодательством
			<p>Проводится вакциной для профилактики полиомиелита (живой), за исключением детей из групп риска (с болезнями нервной системы, иммунодефицитными состояниями или анатомическими дефектами, приводящими к резко повышенной опасности заболевания гемофильной инфекций, с аномалиями развития кишечника; с онкологическими заболеваниями и/или длительно получающим иммуносупрессивную терапию; дети, рожденные от матерей с ВИЧ-инфекцией; дети с ВИЧ-инфекцией, недоношенные и маловесные дети; дети, находящиеся в домах ребенка), которые подлежат ревакцинации против полиомиелита вакциной для профилактики полиомиелита (инактивированной).</p>

Дети в 6 лет	Ревакцинация кори, против эпидемического паротита и краснухи	Проводится всем детям вакцинами, зарегистрированными в России в установленном порядке	финансируется за счет: - средств федерального бюджета, - средств граждан, - средств медицинских организаций частной формы собственности, - других источников, разрешенных законодательством
Третья ревакцинация против полиомиелита	Проводится вакциной для профилактики полиомиелита (живой), за исключением детей из групп риска (с болезнями нервной системы, иммунодефицитными состояниями или анатомическими дефектами, приводящими к резко повышенной опасности заболевания гемофильной инфекцией; с аномалиями развития кишечника; с онкологическими заболеваниями и/или длительно получающим иммуносупрессивную терапию; дети, рожденные от матерей с ВИЧ-инфекцией; дети с ВИЧ-инфекцией, недоношенные и маловесные дети; дети, находящиеся в домах ребенка), которые подлежат ревакцинации против полиомиелита вакциной для профилактики полиомиелита (инактивированной).	финансируется за счет: - средств федерального бюджета, - средств граждан, - средств медицинских организаций частной формы собственности, - других источников, разрешенных законодательством	
Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка	Проводится комбинированными вакцинами с уменьшенным содержанием антигена дифтерии и столбняка, зарегистрированными в России в установленном порядке	финансируется за счет: - средств федерального бюджета, - средств граждан, - средств медицинских организаций частной формы собственности, - других источников, разрешенных законодательством	
Дети в 6-7 лет	Ревакцинация против туберкулеза	Проводится детям не инфицированным микобактериями туберкулеза	финансируется за счет: - средств регионального бюджета, - средств граждан, - средств медицинских организаций частной формы собственности, - других источников, разрешенных законодательством
Дети в 6-7 лет и взрослые⁴	Вторая ревакцинация против коклюша^{4,5}	Проводится группам риска: медицинские работники родильных домов и перинатальных центров, дети с иммунодефицитами, ВИЧ-инфекцией, онкологическими заболеваниями, дети из учреждений закрытого типа, комбинированными вакцинами с уменьшенным содержанием антигена дифтерии и	финансируется за счет: - средств регионального бюджета, - средств граждан, - средств медицинских организаций частной формы собственности, - других источников, разрешенных законодательством

		столбняка, бесклеточным коклюшным компонентом, зарегистрированными в России в установленном порядке	законодательством
Дети в 14 лет ⁴	Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка	Всем детям проводится комбинированными вакцинами с уменьшенным содержанием антигена дифтерии и столбняка, бесклеточным коклюшным компонентом, зарегистрированными в России в установленном порядке	финансируется за счет: - средств граждан, - средств медицинских организаций частной формы собственности, - других источников, разрешенных законодательством
	Третья ревакцинация против коклюша ^{4,5}	Проводится комбинированными вакцинами с уменьшенным содержанием антигена дифтерии и столбняка, зарегистрированными в России в установленном порядке	финансируется за счет: - средств федерального бюджета, - средств граждан, - средств медицинских организаций частной формы собственности, - других источников, разрешенных законодательством
		Проводится группам риска: медицинские работники родильных домов и перинатальных центров, дети с иммунодефицитами, ВИЧ-инфекцией, онкологическими заболеваниями, дети из учреждений закрытого типа комбинированными вакцинами с уменьшенным содержанием антигена дифтерии и столбняка, бесклеточным коклюшным компонентом, зарегистрированными в России в установленном порядке	финансируется за счет: - средств регионального бюджета, - средств граждан, - средств медицинских организаций частной формы собственности, - других источников, разрешенных законодательством
		Всем детям проводится комбинированными вакцинами с уменьшенным содержанием антигена дифтерии и столбняка, бесклеточным коклюшным компонентом, зарегистрированными в России в установленном порядке	финансируется за счет: - средств граждан, - средств медицинских организаций частной формы собственности, - других источников, разрешенных законодательством

Взрослые от 18 лет

<p>Дети с 12 месяцев, взрослые Лица, относящиеся к профессиональным группам риска, которые работают или направляются на сезонные работы в эндемичные районы по клещевому вирусному энцефалиту, и выполняющие следующие виды работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сельскохозяйственные, - гидромелиоративные, строительные, по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные, дератизационные и дезинсекционные; - по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населенив я; - лица, работающие с живыми культурами возбудителя клещевого вирусного энцефалита. <p>Дети из закрытых коллективов, дети выезжающие пionерские и летние оздоровительные лагеря в эндемичных зонах, дети призывающие на эндемичной территории.</p>	<p>Иммунизация против клещевого вирусного энцефалита</p> <p>Проводится вакцинацией зарегистрированными в России в установленном порядке</p>	<p>Вакцинация проводится двукратно, интервал между вакцинальными прививками зависит от вида вакцины и схемы иммунизации, регламентируется инструкциями по применению препаратов в соответствии с инструкциями по применению вакцин</p>	<p>финансируется за счет: - средств федерального бюджета, - средств граждан, - средств медицинских организаций частной формы собственности, - других источников, разрешенных законодательством</p>
--	--	--	--

<p>Дети от 1 года до 17 лет (включительно), женщины от 18 до 25 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно против краснухи, не имеющие сведений о прививках против краснухи</p>	<p>Вакцинация против краснухи, ревакцинация против краснухи</p> <p>Проводится не болевшим, не привитым, привитым однократно против краснухи, не имеющим сведений о профилактических прививках против краснухи</p> <p>Непривитым пациентам, которым планируется проводить хирургические вмешательства, рекомендуется за месяц до операции провести вакцинацию по схеме 0-7-21 день.</p>
<p>Дети от 1 года до 17 лет (включительно), взрослые от 18 до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори; взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, осуществляющих деятельность, организаций торговли, транспорта, коммунальной</p>	<p>Вакцинация против кори, ревакцинация против кори</p> <p>Проводится не болевшим, не привитым, привитым однократно, не имеющим сведений о прививках против кори. Интервал между прививками должен составлять не менее 3 месяцев</p>
	<p>финансируется за счет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средств федерального бюджета, - средств граждан, - средств медицинских организаций частной формы собственности, разрешенных - других источников, разрешенных законодательством

<p>социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори</p>	<p>Дети с 6 месяцев, учащиеся 1 - 11 классов; студенты высших профессиональных и средних образовательных организаций; взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы); беременные женщины; взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением</p> <p>Лица, подлежащие призыву на военную службу</p>	<p>Вакцинация против гриппа</p>	<p>Проводится ежегодно.</p> <p>При проведении вакцинации против гриппа детей с 6-месячного возраста, обучающихся в общеобразовательных организациях, беременных женщин используются вакцины, не содержащие консервантов</p> <p>Проводится разрешенными к применению вакцинами в соответствии с инструкцией по применению препарата</p> <p>Проводится разрешенными к применению вакцинами в соответствии с инструкцией по применению препарата</p> <p>Проводится ранее не болевшим, не имеющим данных о вакцинации, разрешенными к применению вакцинами в соответствии с инструкцией по применению препарата</p>
		<p>финансируется за счет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средств федерального бюджета, - средств регионального бюджета - средств граждан, - средств медицинских организаций частной формы собственности, - других источников, разрешенных законодательством 	

		Вакцинация против Гриппа	Проводится разрешенными к применению вакцинами в соответствии с инструкцией по применению препарата
дети из групп риска в возрасте 2-5 лет; дети с 5 лет и взрослые из групп риска: - дети и взрослые, планирующие трансплантацию органов или кохлеарную имплантацию, - дети и взрослые с онко- гематологическими заболеваниями, - дети с латентной формой туберкулеза, - дети с хроническими заболеваниями органов дыхания, - с муковисцидозом, - дети и взрослые с бронхиальной астмой, взрослые с ХОБЛ, сердечно сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, метаболическими нарушениями и ожирением, - дети, перенесшие пневмонию, -взрослые старше 60 лет; - лица старше трудоспособного возраста, проживающие в организациях социального обслуживания, -ВИЧ инфицированные; -медицинские работники	Вакцинация против пневмококковой инфекции Проводится в возрасте с 12 до 23 месяцев – двукратно с интервалом введения не менее 2-х месяцев, в возрасте с 2-х лет – однократно, в соответствии с инструкцией по применению препарата	финансируется за счет: - средств регионального бюджета, - средств граждан, - средств медицинских организаций частной формы собственности, - других источников, разрешенных законодательством	
Лица, проживающие на энзоотичных по туляремии территориях, а также прибывшие на эти территории лица, выполняющие следующие работы: - сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, другие работы по выемке и перемещению	Против туляремии	с 7 лет (с 14 лет в очагах полевого типа) однократно Ревакцинация через каждые 5 лет В соответствии с инструкциями по применению вакцин	финансируется за счет: - средств регионального бюджета, - средств граждан, - средств медицинских организаций частной формы собственности, - других источников, разрешенных законодательством

заготовительные, геологические, экспедиционные, и дезинсекционные;	промышленные, изыскательские, дератизационные		
- по лесозаготовке, благоустройству оздоровления и отдыха населения.	расчистке леса, зон		
Лица, работающие с культурами возбудителя туляремии	живыми		
Лица, выполняющие работы:	следующие	Против сибирской язвы	В соответствии с инструкциями по применению вакцин
- зооветработники и другие лица, профессионально занятые предубойным содержанием скота, а также убоем, снятием шкур разделкой туш;	лица, занятые		финансируется за счет:
- сбор, хранение, транспортировка и первичная обработка сырья животного происхождения;			- средств регионального бюджета,
- сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, экспедиционные на энзоотичных по сибирской язве территориях.			- средств граждан,
Лица, работающие с материалом, подозрительным на инфицирование возбудителем сибирской язвы			- средств медицинских организаций частной формы собственности,
Лица, выезжающие за пределы Российской Федерации в энзоотичные по желтой лихорадке страны (регионы).			- других источников, разрешенных законодательством
Лица, работающие с живыми культурами возбудителя желтой лихорадки		Против желтой лихорадки	В соответствии с инструкциями по применению вакцин
			финансируется за счет:
			- средств граждан,
			- средств медицинских организаций частной формы собственности,
			- других источников, разрешенных законодательством

	Против гепатита А	двуократно, по схеме в соответствии с инструкцией по применению препарата
Лица, проживающие в регионах, неблагополучных по заболеваемости вирусным гепатитом А, а также лица, подверженные профессиональному риску заражения (медицинские работники, работники сферы обслуживания населения, занятые на предприятиях пищевой промышленности, а также обслуживающие водопроводные и канализационные сооружения, оборудование и сети).	Контактные лица в очагах вирусного гепатита А.	финансируется за счет: - средств регионального бюджета,
По эпидемическим показаниям прививки проводятся при угрозе возникновения эпидемии или вспышки вирусного гепатита А (стихийные бедствия, крупные аварии на водопроводной и канализационной сетях).	Лица, выезжающие в неблагополучные страны (регионы), где регистрируется вспышечная заболеваемость вирусным гепатитом А.	- средств граждан, - средств медицинских организаций частной формы собственности, - других источников, разрешенных законодательством

<p>сотрудники лабораторий, работающих с живой культурой менингокока;</p> <ul style="list-style-type: none"> - воспитанники и персонал учреждений стационарного социального обслуживания с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); - лица, проживающие в общежитиях; - лица, принимающие участие в массовых международных спортивных и культурных мероприятий; - дети до 5 лет включительно (в связи с высокой заболеваемостью в данной возрастной группе); - подростки в возрасте 13 - 17 лет (в связи с повышенным уровнем носительства возбудителя в данной возрастной группе); - лица старше 60 лет; - лица с первичными и вторичными иммунодефицитными состояниями, в том числе ВИЧ-инфицированных; - лица, перенесшие кохлеарную имплантацию; - лица с ликвореей. <p>Вакцинация проводится в эндемичных регионах, а также в случае эпидемии, вызванной менингококками серогрупп А или С.</p>	<p>Против кори</p> <p>В соответствии с инструкциями по применению вакцин</p>	<p>финансируется за счет средств федерального бюджета или регионального бюджета</p>
<p>Контактные лица в очагах кори, ранее не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против кори или однократно привитые без ограничения по возрасту</p>		

<p>Контактные лица в очагах гепатита В, не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против вирусного гепатита В</p> <p>Контактные лица в очагах дифтерии, не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против дифтерии без ограничения по возрасту</p> <p>Контактные лица в очагах эпидемического паротита, не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против эпидемического паротита</p> <p>Контактные лица в очагах полиомиелита, в том числе вызванного диким полиовирусом (или при подозрении на заболевание):</p> <ul style="list-style-type: none"> - дети с 3 месяцев до 15 лет при наличии достоверных данных о предшествующих прививках - однократно; - медицинские работники - однократно; - дети, прибывшие из эндемичных (неблагополучных) по полиомиелиту стран (регионов), с 3 месяцев до 15 лет; - однократно (при наличии достоверных данных о предшествующих прививках) или трехкратно (при их отсутствии); - лица без определенного места жительства (при их выявлении) с 3 	<p>Против гепатита В</p> <p>Против дифтерии</p> <p>Против эпидемического паротита</p> <p>Против полиомиелита</p>	<p>В соответствии с инструкциями по применению вакцин</p> <p>В соответствии с инструкциями по применению вакцин</p> <p>В соответствии с инструкциями по применению вакцин</p>	<p>финансируется за счет федерального бюджета</p> <p>финансируется за счет федерального бюджета</p> <p>финансируется за счет федерального бюджета</p>	<p>или счет средств федерального бюджета</p> <p>или счет средств федерального бюджета</p> <p>или счет средств федерального бюджета</p>	<p>или счет регионального бюджета</p> <p>или счет регионального бюджета</p> <p>или счет регионального бюджета</p>	<p>средств регионального бюджета</p> <p>средств регионального бюджета</p> <p>средств регионального бюджета</p>
---	--	--	--	---	--	---

<p>месяцев до 15 лет - однократно (при наличии достоверных данных о предшествующих прививках) или трехкратно (при их отсутствии);</p> <ul style="list-style-type: none"> - лица, контактировавшие с прибывшими из эндемичных (неблагополучных) по полиомиелиту стран (регионов), с 3 месяцев жизни без ограничения возраста - однократно инактивированной полиомиелитной вакциной; - лица, работающие с живым полiovирусом, с материалами, инфицированными (потенциально инфицированными) диким полiovирусом, без ограничения возраста - однократно при приеме на работу. <p>К приоритету 1-го уровня относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> лица в возрасте 60 лет и старше; взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям: работники медицинских, образовательных организаций, организаций социального обслуживания и многофункциональных центров; лица, проживающие в организациях социального обслуживания, лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением; граждане, проживающие в городах с численностью населения 1 млн и 	<p>Против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2</p>	<p>В соответствии с инструкциями по применению вакцин</p> <p>финансируется за счет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средств регионального бюджета, - средств граждан, - средств медицинских организаций частной формы собственности, - других источников, разрешенных законодательством

более.

К приоритету 2-го уровня относятся:
взрослые, работающие по отдельным
профессиям и должностям:
работники организаций транспорта и
энергетики,
сотрудники правоохранительных
органов, государственных
контрольных органов в пунктах
пропуска через государственную
границу;
лица, работающие вахтовым методом;
волонтеры;
военнослужащие;
работники организаций сферы
предоставления услуг.
К приоритету 3-го уровня относятся:
государственные гражданские и
муниципальные служащие;
учащиеся в профессиональных
образовательных организациях и
образовательных организациях
высшего образования старше 18 лет;
лица, подлежащие призыву на
военную службу.
Дети от 12 до 17 лет (включительно)
(вакцинация проводится добровольно
при наличии письменного заявления
одного из родителей (или иного
законного представителя

Лиц, имеющих высокий риск
заражения бешенством:
лица, работающие с "уличным"
вирусом бешенства;
ветеринарные работники; егеря,
охотники, лесники;

Против бешенства

В соответствии с инструкциями по применению
вакцин
Ревакцинацию проводят однократно через год и
далее каждые три года.

финансируется за счет средств
регионального бюджета;

лица, выполняющие работы по регулированию численности и содержанию животных вакцинируют с профилактической целью	
Контакт и укусы людей бешеными, подозрительными на бешенство или неизвестными животными	В соответствии с инструкциями по применению вакцин

1. Профилактические прививки проводятся гражданам в медицинских организациях при наличии лицензии, предусматривающей выполнение работ (услуг) по вакцинации (проведению профилактических прививок).
2. Профилактические прививки проводят медицинские работники, прошедшие обучение по вопросам применения иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики, организации проведения вакцинации, техники проведения вакцинации, а также по вопросам оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах.
3. Профилактические прививки проводятся с использованием иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, согласно инструкциям по их применению.
4. Перед проведением профилактической прививки лицу, подлежащему вакцинации или ревакцинации, или его законному представителю разъясняется необходимость иммунопрофилактики инфекционных болезней, возможные постvakцинальные реакции и осложнения, а также последствия отказа от проведения профилактической прививки и оформляется информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство в соответствии с требованиями статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
5. Все лица, которым должны проводиться профилактические прививки, предварительно подлежат осмотру врачом (фельдшером), в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 марта 2012 г. N 252н "Об утверждении Порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты"
6. При проведении вакцинации и ревакцинации населения используются вакцины, содержащие актуальные для Российской Федерации антигены, позволяющие обеспечить максимальную эффективность иммунизации, по данным мониторинга Роспотребнадзора
7. Профилактические прививки могут проводиться с использованием иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики, содержащих комбинации вакцин, предназначенных для применения в соответствующие возрастные периоды.
8. При изменении сроков вакцинации ее проводят по схемам, предусмотренным национальным календарем профилактических прививок, утвержденным настоящим приказом, настоящим порядком, и в соответствии с инструкциями по применению иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики. Допускается введение вакцин (за исключением вакцин для профилактики туберкулеза), применяемых в рамках

национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в один день разными шприцами в разные участки тела.

9. При проведении вакцинации против вирусного гепатита В детей первого года жизни, против гриппа детей с 6-месячного возраста, обучающихся в общеобразовательных организациях и в профессиональных образовательных организациях, беременных женщин используются иммунобиологические лекарственные препараты для иммунопрофилактики, не содержащие консервантов.

10. Вакцинация против туберкулеза проводится новорожденным на 3 - 7 день жизни вакциной для профилактики туберкулеза для шадящей первичной вакцинации (БЦЖ-М); в субъектах Российской Федерации с показателями заболеваемости, превышающими 80 на 100 тысяч населения, а также при наличии в окружении новорожденного больных туберкулезом - вакциной для профилактики туберкулеза (БЦЖ). Ревакцинация детям в 6 - 7 лет проводится вакциной для профилактики туберкулеза в родильном доме она может быть проведена в возрасте до 7 лет туберкулиноотрицательным детям.

11. Вакцинация против вирусного гепатита В детей первого года жизни проводится по схеме 0-1-6 (1-я доза - в момент начала вакцинации, 2-я доза

- через месяц после 1-й прививки, 3-я доза - через 6 месяцев от начала вакцинации).

Вакцинация против вирусного гепатита В детей, относящихся к группам риска (родившимся от матерей - носителей HBsAg, больных вирусным гепатитом В или перенесших вирусный гепатит В в третьем триместре беременности, не имеющих результатов обследования на маркеры гепатита В, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества, из семей, в которых есть носитель HBsAg или больной острым вирусным гепатитом В и хроническими вирусными гепатитами), проводится по схеме 0-1-2-12 (1-я доза - в момент начала вакцинации, 2-я доза - через месяц после 1-й прививки, 3-я доза - через 2 месяца от начала вакцинации, 4-я доза - через 12 месяцев от начала вакцинации).

12. Против полиомиелита первая, вторая, третья вакцинации детям 3 месяцев, 4,5 месяцев, 6 месяцев жизни и первая ревакцинация против полиомиелита детям 18 месяцев жизни проводятся вакциной для профилактики полиомиелита (инактивированной); вторая и третья ревакцинации против полиомиелита детям 20 месяцев и 6 лет проводятся вакциной для профилактики полиомиелита (живой).

Дети, относящиеся к группе риска (с болезнями нервной системы, иммунодефицитными состояниями или анатомическими дефектами, приводящими к резко повышенной опасности заболевания гемофильной инфекцией; с аномалиями развития кишечника; с онкологическими заболеваниями и/или длительно получающим иммуносупрессивную терапию; дети, рожденные от матерей с ВИЧ-инфекцией; дети с ВИЧ-инфекцией; недоношенные и маловесные дети; дети, находящиеся в домах ребенка), подлежат второй и третьей ревакцинации против полиомиелита в 20 месяцев и 6 лет вакциной для профилактики полиомиелита (инактивированной).

13. Вакцинация против полиомиелита по эпидемическим показаниям проводится вакциной для профилактики полиомиелита (живой) и вакциной для профилактики полиомиелита (инактивированной). Показаниями для проведения вакцинации по эпидемическим показаниям являются: регистрация для профилактики полиомиелита, вызванных диким или вакцинородственным полiovирусом, выделение дикого или вакцинородственного полiovirusa в биологическом материале человека или из объектов окружающей среды, а также при подтвержденной циркуляции дикого или вакцинородственного полiovirusa.

14. Вакцинация детей от 12 до 17 лет (включительно) против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, проводится добровольно по письменному заявлению одного из родителей (или иного законного представителя).